

1 Tipus d'intervenció	Política pública
2 Descripció de la intervenció	La "Llei 42/2010, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac", entre altres mesures, prohibeix el consum de tabac en parcs infantils
3 Principals determinants de la salut implicats	-Contexte físic: entorn construït – urbanisme, característiques mediambientals, -Contexte socioeconòmic: factors econòmics Entorn: barri
4 Principals eixos de desigualtat implicats	Classe social, gènere, edat
5 Tipus d'avaluació	Avaluació de procés Avaluació de resultats
6 Disseny d'avaluació	Disseny no experimental transversal post
7 Resultats (outcomes)	Nicotina ambiental, variables observacionals de consum de tabac
8 Metodologia quantitativa, qualitativa o mixta utilitzada	Metodologia quantitativa: mesures ambientals i observacionals
9 Fase de l'avaluació	Finalitzada
10 Principals resultats de l'avaluació	En 9 de cada 10 parcs infantils mostrejats (n total de la mostra 102 parcs) hi havia alguna burilla dins del parc. En aquells parcs on s'ha mesurat la nicotina ambiental (n=42) s'ha trobat presència de nicotina en més d'un 62% dels casos
11 Documents relacionats	Article científic en procés
12 Organismes implicats	Agència de Salut Pública de Barcelona, Universitat de Barcelona