

1 Tipus d'intervenció	Política pública
2 Descripció de la intervenció	Llei que, entre altres mesures, inclou la prohibició de consum en determinats espais públics (ampliant els espais de la llei anterior)
3 Principals determinants de la salut implicats	-Context socioeconòmic: polítiques públiques (educació, salut, serveis socials, etc.) -Context físic: entorn construït – urbanisme
4 Principals eixos de desigualtat implicats	Classe social, gènere, edat
5 Tipus d'avaluació	Avaluació de resultats
6 Disseny d'avaluació	Disseny no experimental pre-post
7 Resultats (outcomes)	Nicotina en fase vapor, PM _{2,5} (partícules més petites de 2,5 micres de diàmetre), Presència de persones fumadores, Presència de burilles, Presència de cendrers
8 Metodologia quantitativa, qualitativa o mixta utilitzada	Metodologia quantitativa: qüestionaris i mesures ambientals
9 Fase de l'avaluació	Finalitzada
10 Principals resultats de l'avaluació	Disminució molt important (més del 90%) i significativa dels nivells de nicotina, PM i variables observacionals de consum de tabac mesurades a locals d'hostaleria
11 Documents relacionats	<u>Informe</u> Evaluación del impacto de la Ley 42/2010 en la exposición al humo ambiental del tabaco en la hostelería http://www.seepidemiologia.es/informe-ley-42-2010.pdf <u>Article científic</u> López MJ, Fernández E, Pérez-Rios M, Martínez-Sánchez JM, Schiaffino A, Galán I, Moncada A, Fu M, Montes A, Saltó E, Nebot M. Nicotine Tob Res. 2013 May;15(5):992-6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23100458
12 Organismes implicats	Agència de Salut Pública de Barcelona, Institut Català d'Oncologia, Instituto de Salud Carlos III, Universidad de Santiago de Compostela, Xunta de Galicia i Generalitat de Catalunya

