

1 Tipo de intervención	Política pública
2 Descripción de la intervención	La "Ley 42/2010, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco", entre otras medidas, prohíbe el consumo de tabaco en parques infantiles
3 Principales determinantes de la salud implicados	-Contexto físico: entorno construido – urbanismo, características medioambientales, -Contexto socioeconómico: factores económicos Entorno: barrio
4 Principales ejes de desigualdad implicados	Clase social, género, edad
5 Tipo de evaluación	Evaluación de proceso Evaluación de resultados
6 Diseño de evaluación	Diseño no experimental transversal post
7 Resultados (outcomes)	Nicotina ambiental, variables observacionales de consumo de tabaco
8 Metodología cuantitativa, cualitativa o mixta utilizada	Metodología cuantitativa: mediciones ambientales y observacionales
9 Fase de la evaluación	Finalizada
10 Principales resultados de la evaluación	En 9 de cada 10 parques infantiles muestreados (n total de la muestra 102 parques) había alguna colilla dentro del parque. En los parques en los que se ha medido la nicotina ambiental (n=42) se ha encontrado presencia de nicotina en más de un 62% de los casos
11 Documentos relacionados	Artículo científico en proceso
12 Organismos implicados	Agencia de Salud Pública de Barcelona, Universidad de Barcelona

